

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КЛИМАКТОПЛАН Н

Регистрационный номер: ЛС-002009

Торговое наименование препарата: Климактоплан Н

Международное непатентованное или группировочное наименование ~

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические

Состав:

В одной таблетке содержится:

активные компоненты: Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) (цимицифуга рацемоза) (цимицифуга) D2 - 25,0 мг, Sepia officinalis (Sepia) (сепия официналис) (сепия) D2 - 25,0 мг, Strychnos ignatii (Ignatia) (стрихнос игнатии) (игнатия) D3 - 25,0 мг, Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинария канаденсис) (сангвинария) D6 - 25,0 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 123,75 мг, крахмал пшеничный - 22,50 мг, магния стеарат - 3,75 мг.

Описание

Плоскоцилиндрической формы таблетки от светло-серого до серого цвета, с фаской. Допускается наличие вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Климактерический синдром, сопровождающийся приливами жара, усиленным потоотделением, сердцебиением, головокружением, зудом, нервным напряжением, нарушением сна.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; непереносимость крахмала, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Пациенты с сахарным диабетом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат не предназначен для применения при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1-2 таблетки 3 раза в день, принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта.

Длительность лечения препаратом определяется врачом и составляет 3-4 месяца. Повторные курсы возможны после согласования с врачом.

Побочное действие

Возможны следующие побочные эффекты: аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости, головокружение, желудочно-кишечные расстройства, металлический привкус во рту, менструальные кровотечения, носовое кровотечение. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не рекомендуется принимать одновременно с другими препаратами цимицифуги во избежание усиления побочных эффектов последних.

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В

этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае диагностирования беременности при применении препарата в период пременопаузы прием препарата следует прекратить. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3-х месяцев или необходимости повторения курса рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (6 таблеток) соответствует 0,13 хлебной единицы (ХЕ).

Препарат можно применять пациентам с целиакией. Пациентам с непереносимостью крахмала (заболеванием, отличным от целиакии) не следует принимать препарат, так как в нем содержится пшеничный крахмал.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Так как при приеме препарата возможно появление головокружения, в период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 20 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и пленки ПВХ. По 3 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Альпен Фарма ГмбХ
Германия, 77736 Целль ам Хармерсбах, Штайненфельд 3

Производитель:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

Доктор Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 77736 Целль ам Хармерсбах, Штайненфельд, 3

Фасовщик (первичная упаковка)

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4

Доктор Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 77736 Целль ам Хармерсбах, Штайненфельд, 3

Упаковщик (вторичная упаковка)

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4

Доктор Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 77736 Целль ам Хармерсбах, Штайненфельд, 3

Выпускающий контроль качества

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

Доктор Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 77736 Целль ам Хармерсбах, Штайненфельд, 3

Представительство в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Альпен Фарма», эксклюзивный представитель в России, 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 10, 3 этаж, каб. 2; тел. +7(495) 609-65-72; эл. почта: info.russia@alpenpharma.com; интернет-сайт: www.alpenpharma.ru